O49) SISTEMA REMEEX PARA EL TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO RECURRENTE: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO, SANTIAGO, CHILE

Schlageter, F.(1); MÁSs-lindenbaum, M.(2); Marco, A.(1); Pizarro-berdichevsky, J.(1)

(1): unidad de uroginecología, Hospital Dr. Sótero del río, santiago, Chile (2): Universidad de los Andes, santiago, Chile

OBJETIVO: Reportar nuestra experiencia con el sistema Remeex para tratar incontiencia urinaria de esfuerzo (IOE) recurrente.

MÉTODOS: Se hizo un análisis observacional retrospectivo en nuestra bases de datos entre abril 2017 y febrero 2019. Los criterios de inclusion fueron pacientes que hayan realizado un procedimiemto de sling ajustable. Los outcomes primarios fueron subjetivos (sin fugas de orina reportadas por la paciente). Se analizaron tasas de éxito, complicaciones y número de reajustes necesarios.

RESULTADOS: Se incluyó un total de 10 pacientes. 2 se realizaron el procedimiento con un sistema de Remeex fascial. La edad promedio fue de 60,2 8,2 años. El tiempo de seguimiento promedio fue de 7 6,7 meses. Se describió la IOE recurrente como severa en todas las pecientes. 6 paientes tuvieron incontinencia de orina mixta (IOM) de predominio mixto. 7 de las 10 pacientes son continentes , y sólo una paciente tuvo que realizarse 2 reajusteslas complicaciones encontradas fueron: un seroma varitensor suprapúbico, un granuloma y una paciente presentó urgencia inducida por esfuerzo de novo. La última paciente continuó con terapia de tercera línea con Onabotulinum toxin A y no obtuvo continencia completa debido a una urgeincontinecia urinaria moderada.

CONCLUSIONES: El Sistema Remeex es una opción valiosa y segura para el tratamiento de patologías de manejo comlejo como la IOE recurrente, permitiendo un reajuste de tensión post-operatorio y minizando el riesgo de IOE post-operatoria.