P74) FÍSTULA URETROCUTÁNEA DISTAL COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD DE BEHÇET Y FISTULECTOMÍA CON COLGAJO DE DARTOS DE PREPUCIO

Borgna, V.(1); Sáez, C.(2); Finsterbusch, C.(1);

(1): Servicio Urología, Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile (2): Medicina USACH, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Behçet (EB) es un trastorno multisistémico, crónico y recidivante, de etiología desconocida. Es de baja frecuencia en nuestro país1, caracterizada por cursar con úlceras orales, úlceras genitales, lesiones cutáneas e inflamación ocular, y en menor frecuencia, afección articular, neurológica, vascular y digestiva. Las úlceras genitales son frecuentes en esta enfermedad, con mayor tendencia a presentarse en escroto1; por otro lado, la afectación del pene es rara2. La formación de una fístula uretrocutánea ha sido escasamente reportada en la literatura3,4 y su reparación no está estandarizada. Se presenta caso de fístula uretrocutánea peneana y su manejo quirúrgico.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 41 años de origen haitiano, sin antecedentes mórbidos conocidos, ni conductas sexuales de riesgo. Consulta por lesiones papulosas ulceradas y dolorosas en región ventral del pene, asociadas a adenopatías inguinales. Se toma biopsia de lesión genital que muestra resultado compatible de EB, se complementa con Test de Patergia que resulta positivo. Paciente evoluciona con una fístula uretrocutánea de 8mm en uretra peneana. Se realiza fistulectomía y uretroplastía con colgajo de dartos de prepucio. Tiempo operatorio 90 minutos, Estadía hospitalaria 4 días, evoluciona sin complicaciones.

CONCLUSIONES: La EB debe considerarse entre los diagnósticos diferenciales de lesiones genitales ulceradas con mala respuesta a antibióticos. La formación de una fístula uretrocutánea es muy rara en este caso se utilizó fistulectomía con colgajo de dartos, aislando la piel ante la posible aparición de nuevas úlceras.. La coordinación de equipos multi-especialidad es la única forma de manejar estos casos poco frecuentes y poder llegar al diagnóstico y terapia correspondiente, así evitar complicaciones.