V V) SESIÓN DE VIDEO V

V35) LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA LAPAROSCOPICA EN PACIENTE CON VENA RENAL RETROAORTICA

Díaz Méndez, J.(1)**; Álvarez Overgaag, D.**(1)**; Narváez Fuentes, M.**(1)**; Altamirano Villarroel, J.**(1)**; Sandoval Herrera, C.**(1)**; Vidal Faune, A.**(1)**;**

(1)*: Falp, Santiago, Chile.*

INTRODUCCIÓN: Las venas renales representan el afluente más importante de la Vena Cava Inferior (VCI), desembocando normalmente en ángulo recto a nivel de L2. La disposición retroaortica de la vena renal izquierda es una variación anatómica infrecuente que está presente en alrededor del 2 % de la población, situación que puede complicar significativamente una cirugía retroperitoneal con riesgo de sangramiento e incluso de muerte.

OBJETIVOS: Presentamos el video de un caso de Linfadenectomia Lumboaortica Laparoscópica por Cáncer Testicular con vena renal izquierda retroaortica.

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 19 años que consulta por tumor testicular izquierdo. Con AFP pre orquidectomia de 76, post cirugía normal. Biopsia informa Teratoma inmaduro 90 % y Carcinoma embrionario 10 % , tumor de 6 cms, con permeación vascular. TAC de etapificación no muestra adenopatías patológicas, por lo que se realiza linfadenectomia lumboaortica laparoscópica. Paciente en decúbito lateral utilizando 4 trocares, se evidencia venal renal izquierda retroaortica durante la disección ganglionar.

RESULTADOS: el tiempo operatorio fue de 140 minutos. El sangrado intraoperatorio fue 100 cc, el paciente es dado de alta a las 48 hrs sin complicaciones. Biopsia informa: Sin metástasis 0/24 ganglios.

CONCLUSIÓNES: Las anomalías de disposición de las venas renales, generalmente ignoradas y no referenciadas, representan situaciones poco frecuentes, que involucran mayoritariamente a la vena renal izquierda, que deben tenerse presentes durante la planificación y ejecución de cirugías retroperitoneales.