REVISTA
CHILENA DE
UROLOGÍA

Rev. SCHU 2022; 87 Supl.(1): 15 -27

O08) CIRUGÍA GENITAL EN MUJERES TRANS: RESULTADOS SOBRE LA FUNCIÓN URINARIA

Brusoni, S.[1]; Ralph, C.[2]; Bruzzone, A.[3]; Peralta, M.[4]; Jerez, K.[5]; Arévalo, D.[6]; Arenas, J.[3]; Bernal, J.[3]; Adauy, A.[7]; Cifuentes, M.[8]

[1]: Becado Urología Pontificia Universidad Católica de Chile, Puente Alto, Chile.
[2]: Ginecóloga Complejo Asistencial Sótero del Río, Puente Alto, Chile
[3]: Urólogo Complejo Asistencial Sótero del Río, Puente Alto, Chile.
[4]: Interno de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile, Puente Alto, Chile.
[5]: Kinesióloga de Piso Pélvico, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
[6]: Ginecólogo Becado de uroginecología, Complejo Asistencial Sótero del Río, Puente Alto, Chile.
[7]: Ginecóloga Programa de Identidad de Género, Complejo Asistencial Sótero del Río, Puente Alto, Chile.
[8]: Hospitales Sotero del Río y Carlos van Buren, Diversalud, Viña del Mar, Chile.

Introducción: Cerca de un tercio de las personas trans del espectro femenino buscan procedimientos quirúrgicos para conseguir una apariencia acorde a su identidad de género, siendo la más solicitada la genitoplastía feminizante, que se ofrece en nuestro hospital desde 2018. Entre sus pasos más importantes está acortar la uretra, eliminar parcialmente el tejido eréctil circundante y confeccionar un neomeato para orinar en posición sentada. Esto podría acarrear importantes modificaciones en la función de la vía urinaria inferior, según las escasas publicaciones internacionales que han analizado este tema.

El presente reporte tiene por objetivo describir los resultados en la función urinaria de las primeras mujeres trans operadas de genitoplastía en nuestro centro.

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de todas las personas trans femeninas operadas de genitoplastia feminizante en el Hospital Público Universitario Sótero del Río, en Santiago de Chile, entre los años 2018 y 2022.

Se revisaron historias clínicas extrayendo datos epidemiológicos, demográficos y médicos, datos respecto a la cirugía y al post operatorio. Se realizaron cuestionarios autocompletados (AUA-IPSS) pre y postoperatorios. El análisis estadístico se hizo con programa SPSS, considerando significativo un valor $p < 0,05$.

Resultados: Se incluyeron un total de 20 pacientes. Pormedio de edad 33,4 años (DS 8,07), todas operadas de genitoplastia feminizante por el mismo equipo. Previo a la cirugía en encuesta AUA-IPSS se obtuvieron 13 respuestas: promedio de 3,53 puntos (DS 2,6). En el post operatorio se obtuvieron 18 respuestas: promedio de 4,7 puntos (DS 4,2), ninguna con síntomas severos. Al comparar los resultados pre y post operatorios estos no fueron estadísticamente significativos ($p = 0,907$).

En preguntas sobre micción: 32% de las pacientes refieren mejor micción, 58% no nota cambios, 11% orina peor. 22% describe sensación de vaciado incompleto. 8 de 18 (44,4%) pacientes refieren urgencia miccional postoperatoria 7 de ellas no lo presentaban previamente. 28% refiere escape de orina. Sólo una paciente describe incontinencia nocturna.

Conclusión: En la serie estudiada, existe un aumento de la urgencia miccional y aparición de incontinencia de orina, en relación a los síntomas preoperatorios.